



Het SOA consult

Hélène Driessen, arts M&G

GGD West-Brabant

WDH Breda, 2 november 2015



MSM

- Zeer diverse groep: homo-, biseksueel, transgender
- Subscenes
- Middelengebruik
- 33% heeft seks met wisselende sekspartners (Rutgers, 2014, een wereld van verschil)
- 25% van de MSM met een losse partner gebruikt niet altijd een condoom bij anale seks.





MSM

- Vindpercentage big five soa 22%

(bron: soa poli GGD West-Brabant 2014)

- Vaker syfilis
- Vaker hiv
- LGV



Swingers



- Levensstijl
- Gemiddeld tot hoogopgeleid
- Blank, 30-55 jaar
- Liberale opvattingen over seks
- Middelengebruik
- Geschat 15.000 tot 100.000 stellen

swingers

- Vindpercentage big five: 13%

(bron: soa poli GGD WB 2014)

Vooral chlamydia en gonorrhoe

Vrijwel geen hiv en syfilis



prostituees

- Vindpercentage big five 8,6%

(NB vindpercentage prostituant 10%)





Etniciteit/migranten

- Hiv en hepatitis B endemische landen
- Nederlandse Antillen: 2x zo vaak gonorrhoe en 2x zo vaak chlamydia
- Suriname: vaker gonorrhoe
- Marokko: in 2013 vaker gonorrhoe, in 2014 vergelijkbaar met NL cliënten
- (bron: soa poli GGD WB 2014)





jongeren

- risicogroep voor chlamydia
- Aanzienlijk minder risico op hiv en syfilis indien niet behorend tot andere risicogroep





Hoog risicogroepen soa

- MSM
- Prostituees en prostituanten
- Jongeren < 25 jaar
- Personen afkomstig uit soa endemisch gebied
- Personen met veel wisselende partners
- Partners van bovengenoemde groepen
- Gewaarschuwd voor soa
- Personen met klachten passend bij soa



Wie en waarop testen?

Laag risicogroep

- Chlamydia en evt gonorrhoe.

Biedt jongeren laagdrempeling een chlamydia test aan.

hoogrisicogroep

- Big five: chlamydia, gonorrhoe, hiv, lues en hepatitis B.





Wanneer testen?


- Chlamydia en gonorrhoe: **3 weken** na risicocontact
- Lues en hepatitis B: **2 maanden** na risicocontact
- HIV: **3 maanden** na risicocontact

NB: bij klachten eerder




Hoe testen?

Vrouw: chlamydia en gonorrhoe



Man: chlamydia en gonorrhoe





Hoe testen?

Bij man en vrouw:

Bij verdenking gonorrhoe direct ook kweek afnemen.





Anale uitstrijk?

63% van de chlamydia infecties en 65% van de gonorrhoe infecties bij MSM wordt gemist bij alleen testen van urethra.

STD 2012 Sep;23(9):626-31

Dus test bij MSM ook anaal!





Anale uitstrijk vrouw?

- Afhankelijk van anale seks?
- Onderzoek GGD Zuid-Limburg:
Prevalentie anale chlamydia 8,4% (n=654)
 - Met indicatie 7,9%
 - Zonder indicatie 8,6%



Orale uitstrijk?

- MSM : ja
- Prostituees : ja
- Vrouwelijke swingers: ja
- Gewaarschuwde vrouwen voor gonorrhoe:
ter overweging

- Hiv/syfilis/hepatitis B

bloed prikken

NB chlamydia serologie
geeft geen betrouwbare
uitslag over het nu
hebben van een
chlamydia infectie!!





Behandeling

- Chlamydia
 - Urethraal/oraal: azitromycine 1000 mg po
 - Anaal : doxycycline 2 dd 100 mg 7 dgn
 - LGV : doxycycline 2 dd 100 mg 21 dgn
- Gonorrhoe
 - Ongeacht locatie: ceftriaxon 500 mg i.m.
 - Cave resistentie!



behandeling


- Syfilis

- Lues 1,2 en latens recens: benzathine benzylopenicilline 2x 1,2 milj IE
- Lues latens tarda of van onbekende duur: benzathinebenzylopenicilline 2x 1,2 milj IE op dag 1,8 en 15.

NB Penidural niet meer verkrijgbaar!



Na behandelning go/ct/lues



1 week geen seks!



Controle test noodzakelijk?

Bij gonorrhoe/chlamydia geen controle tenzij.

Bij syfilis: altijd follow-up na behandeling

Advies jongeren < 25 jaar:

Herhaal chlamydia test over een half jaar.





Take home messages

- Durf de seksuele anamnese uit te vragen
- Vraag bij mannen naar MSM contacten en bij echtparen naar swingcontacten
- MSM: anale uitstrijk!
- Chlamydia en gonorrhoe onderzoek bij vrouwen d.m.v. vaginale swab, géén urine of serologie!
- Behandeling gonorrhoe na afname kweek met ceftriaxon i.m.
- **ALTIJD** partners laten waarschuwen en evt. mee behandelen.

